

せき・こえのど
アベシデリンE第②類
医薬品

第②類医薬品

トロ-チ
24粒

アベシデリン



キキョウ

セネガ

マオウ

和薬薬エキス(マオウ・キキョウ・セネガ)配合

せき・こえのど

第②類
医薬品せき・こえのど
アベシデリンE発売元
アサケン製薬株式会社
岐阜県浪井市山田町小洞2008 製造番号
製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10

お問い合わせ先 アサケン製薬(株)

☎ 0572-68-1865

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日を除く)

新作用薬審判制度のお問い合わせ先 020-16-5511

【保存及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期間を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ステープラーやハガキの封筒等は、すばやかに服用してください。



4 976084 055211



販売名:アベシデリンE 第②類医薬品

服用に際しては、この箱の説明書を必ず読んでください。

☒ じてはいけません

1 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録看護師に相談し、守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳薬、解熱薬、かぜ薬、鎮静薬

☑ 相違すること

1 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録看護師に相談してください。(2) 妊娠又は授乳中の方は、医師の指導を受けてください。(3) 産婦科、小児科、アレルギー科、皮膚科、泌尿器科、消化器科、生化学検査、検査不正確、精神科薬、おまひ、麻酔薬、(6) 次の診断を受けた人、心臓病、高血圧、糖尿病、甲狀腺機能障害

2、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。3、5〜6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

鎮咳去痰薬

【効能・効果】咳喘(せーせー、ひゅーひゅー)をとらぬようせき、たん、のどの炎症による声がかれる、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどののはれ

【用法・用量】次の1回量を1日3〜4回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日回数	5歳以上 8歳未満	5歳未満
大人(15歳以上) <td>1粒ずつ2粒まで <td>1粒 <td>1粒 <td>服用しないこと</td> </td></td></td>	1粒ずつ2粒まで <td>1粒 <td>1粒 <td>服用しないこと</td> </td></td>	1粒 <td>1粒 <td>服用しないこと</td> </td>	1粒 <td>服用しないこと</td>	服用しないこと
小児(5歳以上) <td>1粒 <td>1粒 <td>1粒 <td></td> </td></td></td>	1粒 <td>1粒 <td>1粒 <td></td> </td></td>	1粒 <td>1粒 <td></td> </td>	1粒 <td></td>	

【用法・用量に際する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用してください。

【成分・分量】8粒(大人1日量)中

マオウエキス	340mg (原生薬計算量 2.040mg)	気管支炎、気管支炎、また、のどの炎症をやわらげます。
キキョウ流エキス	400mg	気道分泌の分泌を促進した
セネガ流エキス	200mg	たんを払いやすくします。

※添加物:亜硝酸、白糖、水アム、グリセリン、脂肪化エタノール、香料
※本剤は和薬薬エキスを用いた製品ですが、製品により成分や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

A8