

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

口腔・咽喉用薬

つらい口内炎・のどの痛み

第3類医薬品

# アスゲン® T錠

アスゲンT錠は、抗炎症剤のトラネキサム酸を配合しています。炎症のもとに作用して、痛み・はれを鎮めるお薬です。

## ⚠️【使用上の注意】



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
  - (1) 甘草（カンゾウ）又はその主成分グリチルリチンを含む内服薬。（むくみ、血圧上昇及び筋疾患（ミオパチー）等が起こることがあります。）
  - (2) トラネキサム酸を含む内服薬。（鼻炎用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等）
2. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等）、血栓症を起こすおそれのある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。： 下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面へ続く)

## 【効能・効果】

口内炎、咽喉炎・扁桃炎（のどのはれ、のどの痛み）

## 【用法・用量】

下記1回量を1日3回、朝昼晩に服用してください。

年 齢	成 人 (15歳以上)	7歳以上 15歳未満	7歳未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



## 【成分・分量】

6錠（成人1日服用量）中に、次の成分を含有します。

成 分	分 量
トラネキサム酸	750 mg
カンゾウ乾燥エキス（原生薬として990mgに相当）	198 mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）	50 mg
リボフラビン（ビタミンB2）	12 mg
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンCナトリウム）	500 mg


添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、シヨ糖脂肪酸エステル、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、三酸化鉄を含有します。

## ＜成分・分量に関連する注意＞

- (1)本剤に含まれているリボフラビン（ビタミンB2）により、尿が黄色になることがあります。
- (2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合には、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。（水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。）
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 03-3370-7174(代表)

受付時間 9:00 ~ 17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3丁目46番1号

製造販売元 **アズケン製薬株式会社**  
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008