

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

※部：2016年5月改訂

鎮咳去痰薬

和漢薬エキス配合

第②類医薬品

喘妙シロップ

販売名：喘妙シロップa

喘妙シロップは、せき、喘鳴（ゼーゼー、ひゅーひゅー）をとまなうせき、たんによぐれた効き目のある和漢薬エキスを主剤としたシロップ剤です。

小さなお子様からお年寄りまで、どなたでも服用しやすく、かぜや気道粘膜のアレルギー症状に伴う、せき、たんによぐれた効果をあらわします。又、喘鳴（ゼーゼー、ひゅーひゅー）をとまなうせきに対しても、気管支を拡げ、たんを切れやすくし、胸の重苦しさをとり呼吸困難をやわらげます。

【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
3. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください：

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

（裏面へ続く）

※【効能・効果】

せき、喘鳴（ぜーぜー、ひゅーひゅー）をともなうせき、たん

【用法・用量】

下記1回量を1日4回、毎食後及び就寝前に服用してください。

年齢	成人 (15歳以上)	11歳以上 15歳未満	8歳以上 11歳未満	5歳以上 8歳未満	1歳以上 5歳未満	3ヵ月以上 1歳未満	3ヵ月未満
1回量	10mL	7 mL	5 mL	3 mL	2 mL	1 mL	服用しないこと

やむをえない場合は、上記用量を4時間ごとに1日6回まで服用できます。使用に際しては、よく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむをえない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

褐色～黒褐色の液剤で、60mL（成人1日服用量）中に、次の成分を含有します。

成分	分量
マオウエキス（原生薬として3gに相当）	510 mg
カンゾウエキス（原生薬として1gに相当）	250 mg
ケイヒ流エキス（原生薬として1gに相当）	1 mL
ショウキョウ流エキス（原生薬として1gに相当）	1 mL
サイシン流エキス（原生薬として1gに相当）	1 mL
ゴミシ流エキス（原生薬として1gに相当）	1 mL
ハンゲエキス（原生薬として2gに相当）	80 mg
ノスカピン塩酸塩水和物	38 mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	240 mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.2 mg
無水カフェイン	72 mg

添加物として、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、プロピレングリコール、グリシン、白糖、炭酸水素Na、香料を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は、和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。が、効果には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)ビンのフタのしめ方が悪いと内容物が流れ出たりすることがあります。服用後はビンの口をよく拭いてからフタを十分にしめてください。
- (5)計量容器は、使用のつど、水洗い等をして常に清潔に保管してください。
- (6)使用期限（外箱、ラベルに表示）を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

アスゲン製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：0572-68-1865
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **アスゲン製薬株式会社**
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008